

Utilidad del Female Sexual Function Index (FSFI) en la evaluación de pacientes que consultan por disfunción sexual

Bechara, A.; Bertolino, MV., Casabé A.; Literat, B.; Casabé, A.; Secin, F.; Fredotovich, N

Abstrac TTL-20 pag:46 XL Congreso Argentino de Urología, Setiembre 2003

Introducción: Uno de los aspectos fundamentales en la evaluación de las mujeres que consultan por disfunción sexual, es determinar qué fase de la respuesta sexual constituye el elemento disparador de su dificultad la cual, en general se manifiesta como una mezcla de síntomas que no permiten identificar fácilmente la queja primaria. Nuestro objetivo fue evaluar la correlación de los distintos dominios del FSFI con el tipo de disfunción sexual que presentaban las mujeres que consultaron en nuestro hospital, para considerar el grado de orientación diagnóstica del mismo

Material y Métodos: Fueron analizadas las historias clínicas de 91 pacientes que consultaron al Sector de Disfunciones Sexuales del Hospital Durand y a las que se les realizó, como parte de la evaluación diagnóstica de Disfunción Sexual femenina (DSF), un cuestionario FSFI.

La evaluación global fue realizada mediante historia médica clínica y sexual, examen físico general y ginecológico, evaluación psicosexual, exámenes de laboratorio incluyendo dosajes hormonales y determinación del flujo vascular clitorideo con ecodoppler color. Fueron excluidas 14 pacientes las cuales manifestaron no tener actividad sexual en las respuestas del FSFI.

Resultados: Las 77 pacientes restantes e incluidas tenían una edad promedio de 39 años +/- 13.9 (mediana: 37 y rango: 17 -72). Los diagnósticos fueron: Disfunción del orgasmo (DO) 41.6 %, del deseo (DD) 28.6 %, dispareunia (DIS) 15.6 %, disfunción de la excitación (DE) 7.8 % y vaginismo (VAG) 6.5. %. La edad promedio fue 36,8 años +/- 15,1, 43,3 años +/- 10,9; 38,6 años +/- 14,5; 45,3 años +/- 16,6; 28,6 años +/- 5,6 respectivamente para cada diagnóstico.

Fueron analizados los resultados globales del FSFI, y de sus diferentes dominios (deseo, excitación, lubricación, satisfacción y dolor) y relacionados con el diagnóstico.

	n:	Edad Mediana	DS	Edad Promedio	FSFI Mediana	DS	FSFI Promedio
Global	77	37	13,9	39	19	6,1	19,7
Orgasmo	32	31	15,1	36,8	21,1	5,5	21,4
Deseo	22	45,5	10,9	43,3	19,1	5,8	18,5
Dispareunia	12	40,5	14,5	38,6	17,7	7,7	19,8
Excitación	6	54	16,6	45,3	16,6	3,1	16,3
Vaginismo	5	30	5,6	28,8	20,1	9,2	19

Conclusión: La mediana de FSFI de acuerdo a los diagnósticos fue similar sin embargo un valor más bajo se observó en pacientes con dificultades en la fase de excitación.

Cada diagnóstico correlacionó con el valor más bajo en el dominio correspondiente a la evaluación del mismo.